



TRATAMIENTOS DE COVID-19 Y MEDICAMENTOS

Lo que debe saber

Si das positivo en la prueba de COVID-19 y es más probable que se ponga muy enfermo, hay tratamientos disponibles que pueden reducir las posibilidades de hospitalización y muerte.

No se demore: El tratamiento debe iniciarse a los pocos días de presentar los primeros síntomas para que sea eficaz.

Otros medicamentos pueden ayudar a reducir los síntomas y ayudarle a controlar la enfermedad.

Estar vacunado le hace mucho menos probable que se enferme gravemente. Sin embargo, algunas personas vacunadas, **especialmente las que tienen 65 años o más o que tienen otros factores de riesgo de padecer una enfermedad grave**, pueden beneficiarse del tratamiento si se contagian de COVID-19. Un profesional de la salud le ayudará a decidir qué tratamiento si es que hay alguno, es el adecuado para usted.

Los medicamentos para tratar el COVID-19 deben ser recetados por un proveedor médico y empezar a tomarlos lo antes posible después del diagnóstico para que sean efectivos. Póngase en contacto con un médico de inmediato para determinar si puede recibir tratamiento, incluso si sus síntomas son leves en este momento.

Tipos de tratamiento

La FDA ha autorizado ciertos medicamentos antivirales y anticuerpos monoclonales para tratar COVID-19 de leve a moderada en personas que son más propensas a enfermarse de gravedad.

- Los tratamientos antivirales se dirigen a partes específicas del virus para impedir que se multiplique en el cuerpo, lo que ayuda a prevenir la enfermedad grave y la muerte.
- Los anticuerpos monoclonales ayudan al sistema inmunitario a reconocer y responder más eficazmente al virus.

HAGA CLIC EN EL NOMBRE DEL MEDICAMENTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Tratamiento

Quién

Cuándo

Cómo

**Nirmatrelvir
con Ritonavi
(Paxlovid)
Antiviral**

**Adultos;
niños 12 años
en adelante**

**Empezar lo antes
posible; debe
comenzar
dentro de los 5 días
siguientes al inicio de
los síntomas**

**Tomado en
casa por
boca (vía oral)**

**Remdesivir
(Veklury)
Antiviral**

**Adultos y
niños**

**Empezar lo antes
posible; debe
comenzar
dentro de los 7 días
siguientes al inicio de
los síntomas**

**Por vía
intravenosa
(IV)

Infusiones (IV)
en un hospital
durante 3 días
consecutivos**

**Bebtelovimab
anticuerpo
monoclonal**

**Adultos;
niños de
12 años en
adelante**

**Empezar lo antes
posible; debe
comenzar
dentro de los 7 días
siguientes al inicio de
los síntomas**

**Inyección
intravenosa
única**

**Molnupiravir
(Lagevrio)
Antiviral**

Adultos

**Empezar lo antes
posible; debe
comenzar dentro de
los 5 días siguientes al
inicio de los síntomas.**

**Tomado en
casa por boca
(vía oral)**



**PUBLIC HEALTH
SAUK COUNTY**

Together we thrive

Manejo de los síntomas de la COVID-19

La mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa. Puedes tratar los síntomas con medicamentos de venta libre, como el paracetamol (Tylenol) o el ibuprofeno (Motrin, Advil), para ayudarte a sentirte mejor.



PUBLIC HEALTH
SAUK COUNTY
WISCONSIN
Together we thrive

Prevención del COVID-19

- Las vacunas COVID-19 disponibles en los Estados Unidos protegen eficazmente a las personas de enfermarse gravemente, ser hospitalizadas e incluso morir, especialmente a las personas que tienen el refuerzo.

La FDA ha emitido una autorización de uso de emergencia para tixagevimab más cilgavimab (Evusheld), un medicamento utilizado en adultos y niños mayores de 12 años. Evusheld consiste en dos anticuerpos monoclonales que se administran juntos para ayudar a prevenir la infección por el virus que causa el COVID-19. Un profesional de la salud administra Evusheld en forma de 2 inyecciones intramusculares (IM) separadas y consecutivas en la consulta del médico o en un hospital. Si usted está moderadamente o severamente inmunocomprometido o es severamente alérgico a las vacunas COVID-19, puede ser elegible para Evusheld.

Algunos tratamientos pueden tener efectos secundarios o interactuar con otros medicamentos que esté tomando. Pregunte a su médico si los medicamentos para tratar el COVID-19 son adecuados para usted.

Si está hospitalizado, su proveedor de atención médica podría utilizar otros tipos de tratamientos, dependiendo de lo enfermo que esté. Estos podrían incluir medicamentos para tratar el virus, reducir una respuesta inmune hiperactiva o tratar las complicaciones de la COVID-19.

Los medicamentos adecuados para el COVID-19 pueden ayudar. Hay personas que han sufrido daños graves e incluso han muerto después de tomar productos no aprobados para tratar o prevenir el COVID-19, incluso productos aprobados o recetados para otros usos. Hable con un proveedor de salud acerca de si debe tomar medicamentos para tratar el COVID-19.